

QCM d'autoévaluation, exercice 60 page 402

Sésamath

Maths TS obligatoire



Un client désœuvré à la terrasse d'un café décide de compter le nombre de voitures rouges qui roulent dans la ville.

Pour avoir un intervalle de confiance de rayon $0,05$ au seuil de 95% , le client aurait dû compter :

- a) 100 voitures
- b) 400 voitures
- c) 1 000 voitures
- d) 4 000 voitures

Rappel

La proportion p inconnue est telle que, pour

$$n \geq 30, nf \geq 5 \text{ et } n(1 - f) \geq 5,$$

on a :

$$P \left(f - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq p \leq f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \geq 0,95.$$

L'intervalle

$$\left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} ; f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

est appelé intervalle de confiance de la proportion p au seuil (ou niveau) de confiance de 95 %.

Le rayon de l'intervalle de confiance est :

$$\frac{1}{\sqrt{n}}$$

Le rayon de l'intervalle de confiance est :

$$\frac{1}{\sqrt{n}}$$

On doit donc résoudre :

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,05$$

Le rayon de l'intervalle de confiance est :

$$\frac{1}{\sqrt{n}}$$

On doit donc résoudre :

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,05 \Leftrightarrow \sqrt{n} = 20$$

Le rayon de l'intervalle de confiance est :

$$\frac{1}{\sqrt{n}}$$

On doit donc résoudre :

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,05 &\Leftrightarrow \sqrt{n} = 20 \\ &\Leftrightarrow n = 400\end{aligned}$$

Le rayon de l'intervalle de confiance est :

$$\frac{1}{\sqrt{n}}$$

On doit donc résoudre :

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,05 &\Leftrightarrow \sqrt{n} = 20 \\ &\Leftrightarrow n = 400\end{aligned}$$

réponse **b)**